

Processionnaires du pin

Techniques de lutte

- > **Aérienne** : pour les arbres très hauts, les grandes étendues à traiter et non accessibles par le sol.
- > **A partir du sol** : pour les arbres de taille moyenne et dans les parcelles très morcelées, les arbres isolés.



- Traitement à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique
- Traitement à l'aide d'un pulvérisateur à dos
- Coupe des nids à l'aide d'un échenilloir.



Echenillage

Vérifier auprès de votre commune, si elle est inscrite dans un plan de lutte collective.

Précautions à prendre : Ne pas toucher les chenilles, ne pas manipuler les nids, éviter les zones à risques durant les périodes critiques. Informer, surveiller particulièrement les enfants durant les périodes à risques.

La lutte individuelle n'est pas souhaitable, seule la lutte collective est réellement efficace.

Adresses utiles :

- > **Mairie de votre commune**
- > **FEREDEC Bretagne**
- > **Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt - Service Régional de la Protection des Végétaux** : 280, rue de Fougères
35700 RENNES - 02 99 87 45 87
- > **Les Fédérations Départementales** :
 - Morbihan : FEMODEC 02 97 63 09 09
 - Ille-et-Vilaine : FEVILDEC 02 23 21 18 19
 - Côtes d'Armor : FECODEC 02 96 01 37 00
 - Finistère : FEFIDEC 02 98 43 04 44

Cette plaquette a été réalisée en collaboration avec le Département de la Santé des Forêts.



Avec l'aimable participation des correspondants D.S.F. de Bretagne et l'O.N.F.

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Bretagne

ZA de Bellevue - 5, rue Antoine de St-Exupéry - 35235 Thorigné Fouillard

Tél. 02 23 21 18 18 - Fax : 02 99 27 56 89

Mail : feredec@feredec-bretagne.com - Site internet : <http://www.feredec-bretagne.com>



La chenille processionnaire du pin




Conception graphique page 1/1 02 99 32 08 09 - Photos FEREDEC BRETAGNE



Processionnaires du pin

Historique et situation :

- > Depuis les années 70, l'aire de répartition géographique de la chenille processionnaire du pin est en nette progression. La chenille est présente dans le sud Finistère, une grande partie du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine, l'est des Côtes d'Armor. En janvier 2005, une progression est observée sur le littoral nord.



Source : Département de la Santé des forêts, 2005.

- > En Bretagne, les infestations ont lieu tous les 7-8 ans avec des phases de gradation d'environ 4 ans. A noter que la population est régulée par un complexe parasite et de prédateurs qui s'installent peu à peu, d'où la nécessité de ne pas réaliser des traitements systématiques.

Processionnaires du pin

Comment la reconnaître ?

- > Le papillon est nocturne et présente un aspect différent selon le sexe.



Adulte femelle



Adulte mâle

- > Cet insecte a un cycle annuel (1 génération par an). Sa présence est facilement repérable :
 - L'hiver par de gros nids soyeux blancs dans les pins et parfois les cèdres.
 - De février à début mai par des processions au sol pouvant être assez spectaculaires.



DSF, 2005. Procession en cours d'enfouissement.



Quels risques, à quelles périodes ?

Des poils urticants...

- > Les poils urticants se présentent sous la forme de petits harpons venimeux qui ont la faculté de rentrer dans les couches inférieures de l'épiderme. Les réactions chez l'humain et l'animal peuvent être des œdèmes, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des allergies, de l'œdème conjonctival, cataracte, décollement de la rétine...